

ソバルディ®錠400mgを ボトルで調剤される薬剤師の皆様へ

—ボトルの開け方のご案内—

乳幼児による誤飲を防止するため、本剤のボトルではキャップを開けにくい構造にしています。キャップの開け方を患者様と一緒に試していただくなど、ご指導をお願いいたします。また、ボトル内の詰め物と乾燥剤(シリカゲル)の誤飲にご注意いただくよう患者様へお伝えいただくか、調剤の際に取り除いてお渡しください。

- 1 ボトルをつかみ、
キャップを上から下に
押しこんでください。




- 2 キャップを下に押しながら、
左方向に回す(反時計回り)と
キャップを開けることが
できます。




※キャップを閉める際は、右方向に回す(時計回り)だけで閉まります。キャップを押しこむ必要はありません。

キャップの開け閉めについては、患者様に複数回ご指導ください。

- 3** アルミのシールに、
スプーンの柄などで
穴を開けてください。



- 4** お薬を取り出す
さまたげにならないよう、
アルミのシールを
取り除くか、
内側に折り曲げて
ください。



※ その際、ケガをしないよう気をつけてください。

- 5** ボトルの中に入っている
乾燥剤と詰め物を
完全に取り除き、
アルミのシールと
一緒に捨てて
ください。



※ 乾燥剤はボトルの底に沈んでいることがあります。
必ず取り除いてください。